



بسته بندی: هر جعبه حاوی ۱۰ عدد آمپول فاموتیدین (۲۰ میلی گرم در ۲ میلی لیتر) می باشد.

References:

- 1.USP DI 2007, Vol2, pages:15731581 & 158-
- 2.DRUG FACTS AND COMPARISONS 2017,Vol 3, page 23682378-
- 3.UpToDate Medical, <https://uptodate.com/>
4. Hogan li RB, Hogan Iii RB, Cannon T, Rappai M, Studdard J, Paul D, Dooley TP. Dual-histamine receptor blockade with cetirizine-famotidine reduces pulmonary symptoms in COVID-19 patients. Pulmonary pharmacology & therapeutics. 2020 Aug 1; 63:101942.
5. Nurmatov UB, Rhatigan E, Simons FE, Sheikh A. H2-antihistamines for the treatment of anaphylaxis with and without shock: a systematic review. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 2014 Feb 1;112(2):12631-.
6. Lin RY, Curry A, Pesola GR, Knight RJ, Lee HS, Bakalchuk L, Tenenbaum C, Westfal RE. Improved outcomes in patients with acute allergic syndromes who are treated with combined H1 and H2 antagonists. Annals of emergency medicine. 2000 Nov 1;36(5):4628-.
7. Nooka AK, Gleason C, Sargeant MO, Walker M, Watson M, Panjic EH, Lonial S. Managing infusion reactions to new monoclonal antibodies in multiple myeloma: daratumumab and elotuzumab. Journal of Oncology Practice. 2018 Jul;14(7):41422-.
- 8.Injectable Drugs,19th Edition.vol 1pages:506511-

Believe in a Quick Relief



موارد مصرف: (۱-۷)

- درمان کوتاه مدت زخم معده ی خوش خیم و زخم دوازدهه.
- ۲-ر فلاکس و افزایش ترشح اسید معده (به طور مثال: سندروم زولینگر-الیسون و آدنوماهای اندوکرینی متعدد).
- ۳-درمان کمکی در مدیریت شوک آنافیلاکسی.
- ۴-بهبود علائم زجر تنفسی ناشی از SARS-COV-2
- ۵-موثر در درمان کهیر های مقاوم.
- ۶-به عنوان Premedication در مدیریت واکنش های حین تزریق آنتی های مونوکلونال.

موارد منع مصرف: (۳)

- حساسیت به فاموتیدین یا هر یک از ترکیبات موجود در فرآورده.
- حساسیت به سایر داروهای مهارکننده گیرنده H2.

هشدارها و احتیاط ها:

در صورت نارسایی متوسط یا شدید کلیوی با پزشک خود مشورت کنید. احتمال افزایش فواصل QT با مصرف این دارو در بیماران دارای نقص عملکرد کلیوی وجود دارد.
ناسازگاری ها (۶): آمپول فاموتیدین با داروهای آموتریپسین B، آزیترومایسین، پنتوپرازول، فورزماید و پپراسیلین سدیم/تازوباکتام در تزریق Y-site ناسازگار است.

تداخلات: (۱و۲)

نیلوتینیب-داساتینیب-جفتینیب-آنازاناویر-متیل فنیدات-آنتی اسیدها-سفروروکسیم-مزالامین-کلیه ی عوامل افزایش دهنده ی QT-پوساکونازول-میفپریستون-مولتی ویتامین ها و مینرال های حاوی ملح آهن-وارنیکلین.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- دارو از جفت عبور کرده و در رده B قرار دارد و همچنین در شیر ترشح می شود.
- مصرف فاموتیدین در دوران بارداری و شیردهی تنها با نظر پزشک مجاز است.

مقدار و نحوه مصرف:

آماده سازی جهت مصرف:

تزریق آهسته وریدی:

محتویات یک آمپول فاموتیدین را با محلول قابل تزریق سدیم کلراید ۰.۹٪ یا دکستروز ۵٪ یا رینگر لاکتات رقیق کرده و به حجم ۵ یا ۱۰ میلی لیتر برسانید.

انفوزیون وریدی:

محتویات یک آمپول فاموتیدین را با ۱۰۰ میلی لیتر دکستروز ۵٪ یا سایر محلول های سازگار (سدیم کلراید ۰.۹٪ و رینگر لاکتات) رقیق کنید.

نحوه نگهداری: دارو در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد (یخچال) نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد. از نظر فیزیکی شیمیایی محلول رقیق شده تا ۲۴ ساعت در دمای یخچال یا در دمای اتاق پایدار است ولی از نظر میکروبیولوژیکی توصیه میشود محلول رقیق شده بلافاصله مصرف شود.

FAMOTIDINE

20mg/2ml



Believe in a Quick Relief

FAMOTIDINE

20mg/2ml



Believe in a **Quick Relief**