



LIGNODIC-D

Lidocaine-Dextrose
IntraSpinal

موارد مصرف:
بی حسی موضعی نخاعی

Caspian
Tamin
Pharmaceutical Co.



کاسپین تامین
شرکت داروگذاری
ایران پاکستان

توزیع توسعه پخش هجرت

لیگنودیک - دی ° دوکائین هیدروکلراید ۵ درصد + دکستروز ۷/۵

دسته دارویی:
ابن حس کننده موضعی

فارماکولوژی:

ابن حس کننده های موضعی از طریق مسدود نمودن شروع و القاء ایمپالس های عصبی توسط کاهش نفوذ بدیری غشاء نرونها به بون سدیم آثار خود را ایجاد می نمایند. همچنین غلظت دارو چهت بلاک نمودن اعصاب بزرگتر، بیشتر از غلظت مورد نیاز چهت اعصاب محیطی کوچکتر می باشد.

فارماکوکنیتیک:

میزان جذب دارو وابسته به محل و روش تجویز می باشد. زمان لازم چهت رسیدن به حداقل غلظت ۱۰-۳۰ دقیقه می باشد. حذف دارو به صورت متاپولیت و از راه کله می باشد. حداقل دوز ۱/۵-۲۵ میلی گرم بصورت دفع می شود. میزان اتصال به پروتئین آن ۹۰-۹۶٪ می باشد. نیمه عمر آن در بزرگسالان ۱/۵-۲۵ ساعت و در نوزادان ۳/۲ ساعت می باشد.

موارد مصرف:

ایجاد ابن حس موضعی نخاعی

روشن و مقدار مصرف:

مقادیر مصرف ابن حس دارو چهت رسیدن به شرایط بدنی بیمار و نوع عمل جراحی و طول مدت مورد نیاز چهت ابن حس توسط پزشک معالج تعیین می گردد. قدمت شود حداقل دوز ایجاد کننده می خسی باید استفاده شود.

بزرگسالان :

- در زایمان طبیعی ۵۰ میلی گرم محلول ۵٪ چهت ایجاد ۱۰۰ دقیقه می خسی می باشد
- در سازاری ۷۵ میلی گرم محلول ۵٪
- در جراحیهای شکمی ۷۵-۱۰۰ میلی گرم محلول ۵٪

کودکان:

- اطفال تا ۵ کیلوگرم به میزان ۲/۵ میلی گرم / کیلوگرم
- اطفال ۵-۱۵ کیلوگرم به میزان ۲ میلی گرم / کیلوگرم
- کودکان بیش از ۱۵ کیلوگرم به میزان ۱/۵ میلی گرم / کیلوگرم

مصرف در بارداری و شیردهی :

مطلوبات در حیوانات اثمار مکوس بر روی چنین را نشان نداده است . در زمان بارداری گروه "B" می باشد. این دارو به شیر ترشح می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

- بلوک قلبی کامل
- خونریزی شدید
- افت فشار خون شدید
- شوک
- غرفت در محل تزریق
- سیستم عصبی

در موارد ذیل با احتیاط مصرف شود:

نارسانی احتقانی، قلب، نارسانی کبدی، حساسیت به دارو، بیماریهای کلیوی و نیز بیماران سیار جوان ، مسن و افراد ناتوان، در صورت تغییر رنگ از مصرف دارو خودداری شود.

عوارض جانبی :

عوارض قلبی عروقی شامل کاهش فشار خون ، باردی کاردی ، ایست قلی و تنفس ، عوارض عصبی شامل سردردهای بعد از می خسی و درد پشت ، سرگیجه ، آنسی ، بیوست ، تکثر ادرار با مدفعه ، تب، عدم هوشیاری، تهوع و استفراغ، راشهای بوسنتی و تخریب ریشه عصب لوموساکرال .

تداخلات دارویی :

مصرف همیمان با بتا ادرنوزیک بلاکرها، سایمتیدین، آنتی کوکاکولتها، هالوتان، مهارکننده های موتوامین اکسیداز و اوپیوئیدها تداخل دارد.

نحوه نگهداری دارو:

دور از نور، در دمای کمتر از ۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از بین زدگی محافظت شود.

پسته بندی:

هر پسته حاوی ۱۰ عدد آمبول ۲ میلی لیتری لیگنودیک - دی ° می باشد.



WWW.casplantamin.com

Manufactured by: Caspian Tamin Co.

First Entrance-Rashid Industrial Zone- Rasht-Iran

تولید شرکت دارو سازی کاسپین تامین رشت - ایران

