



این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

موارد مصرف

-درمان کمبود اولیه کارنیتین سیستمیک

-درمان حاد و مزمن کمبود ثانویه کارنیتین در بیماران با نقص مادرزادی متابولیسم

هشدارها و راهنمایی ها

-اندازه گیری فاکتورهای خونی و غلظت کارنیتین پلاسما به طور دوره ای می بایست انجام گیرد.

-عوارض گوارشی به دنبال مصرف سریع دوزهای بالای این دارو (بدون افزایش تدریجی) ممکن است بروز نماید.

-از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

-دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار معمول مصرف این دارو به قرار زیر است:

بزرگسالان:

۱ تا ۳ گرم در روز برای فرد ۵۰ کیلوگرمی، که معادل ۱۰ تا ۳۰ میلی لیتر از محلول خوراکی می باشد. دوزهای بالاتر بایستی با دقت و پس از بررسی های کلینیکی و بیوشیمیایی تجویز شود. دارو بایستی با دوز ۱۰ میلی لیتر در روز شروع شود و به تدریج با توجه به تحمل و پاسخ درمانی بیمار افزایش یابد.

نوزادان و کودکان:

۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم/کیلوگرم در روز که معادل ۵/۰ تا ۱۰ میلی لیتر/کیلوگرم در روز از محلول خوراکی می باشد. دوزهای بالاتر بایستی با دقت و پس از بررسی های کلینیکی و بیوشیمیایی تجویز شود. دارو بایستی با دوز ۵۰ میلی گرم/کیلوگرم در روز شروع شود و بتدریج با توجه به تحمل و پاسخ درمانی بیمار تا حداکثر ۳ گرم در روز (۳۰ میلی لیتر در روز) افزایش یابد.

نحوه مصرف:

دارو به صورت خوراکی و در دوزهای منقسم (۳ یا ۴ ساعت یک بار) ترجیحاً ما بین غذا یا بعد از آن و با افزایش تدریجی دوز مصرف می شود.

موارد احتیاط

-ایمنی و کارایی محلول خوراکی ال - کارنیتین در بیماران با عیب کار کلیه ارزیابی نشده است.



- تجویز مزمین دوزهای بالای ال - کارنیتین در بیماران با نارسایی شدید کلیه دیالیزی، ممکن است منجر به تجمع متابولیت‌های سمی بالقوه شود.

عوارض جانبی

- عوارض گوارشی: در تجویز طولانی مدت ال - کارنیتین خوراکی عوارض گوارشی خفیف شامل: تهوع، استفراغ، گرفتگی عضلات شکمی و اسهال گزارش شده است. میاستنی خفیف فقط در بیماران اورمیک دیده شده است.

- عوارض سیستم عصبی مرکزی: در بیماران بدون سابقه ی قبلی حملات صرع، حملات ناگهانی تشنجی و در بیماران با سابقه حملات صرع، افزایش در تناوب و یا شدت تشنج گزارش شده است.

مصرف در بارداری و شیردهی

گروه B. تنها در صورتیکه به طور وضوح مورد نیاز باشد، تجویز گردد. در مادران شیرده به طور خاص مورد مطالعه قرار نگرفته است بنابراین باید با احتیاط مصرف شود.

شرایط نگهداری

دور از نور و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی

هر بطری حاوی ۱۲۰ میلی لیتر محلول خوراکی ال - کارنیتین ۵۰۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر می باشد.

سایز: A6