



این دارو بیمارستانی است.

موارد مصرف^(۱)

پاپاورین هیدروکلراید به عنوان یک داروی ضداسپاسم در بهبود کاهش خون رسانی ناشی از انفارکتوس حاد میوکارد، ایسکمی مغزی، آئزین و آمبولی عروق محیطی و ریبی به کار می رود. علاوه بر این می تواند با اثرات آنتی اسپاسمودیک بر عضلات صاف مجاری ادراری، صفراوی و روده ای تأثیر گذاشته و در شرایطی مثل کولیک روده ای استفاده شود.

هشدارها و راهنمایی ها^(۱،۲)

مصرف مقادیر بالای پاپاورین می تواند منجر به بروز آریتمی های جدی (مثل ضربان زودرس بطنی یا تاکی کاردی حمله ای) شود. از این رو لازم است تا این دارو با احتیاط کامل تجویز شود.

مصرف طولانی مدت پاپاورین می تواند با تأثیر بر بیلی روبین و گلو تامیک ترنس آمیناز سرم باعث بروز هپاتیت مزمن شود بنابراین در صورت مشاهده علائمی همچون بروز حساسیت کبدی، زردی، انوزیوفیلی آشکار و یا تغییر در نتایج تست کبدی نیاز است تا دارو به سرعت قطع شود.

تزریق وریدی برای کودکان کمتر از ۱۵ سال توصیه نمی شود.

مصرف پاپاورین در بیماران مبتلا به گلوکوم باید با احتیاط صورت گیرد.

مقدار و نحوه مصرف^(۱،۲)

اسپاسم عروقی در بزرگسالان:

تزریق عضلانی یا وریدی: ۳۰ تا ۱۲۰ میلی گرم، در صورت نیاز، امکان تکرار دوز تجویزی هر سه ساعت وجود دارد.

در صورت بروز کاردیک اکستراسیستول در حین تجویز، می توان دو دوز از دارو را به فاصله ۱۰ دقیقه تجویز کرد.

نحوه تجویز: تزریق وریدی آهسته طی ۱ تا ۲ دقیقه یا تزریق عضلانی

موارد منع مصرف^(۱)

تزریق وریدی این دارو در بیماران مبتلا به بلوک کامل دهلیز بطنی به دلیل احتمال بروز ضربان های زودرس و تاکی کاردی حمله ای ممنوع می باشد.

تزریق داخل پنیس این دارو می تواند با پریاپیسم مداوم همراه باشد، از این رو مصرف آن در درمان ناتوانی جنسی ممنوع می باشد.

عوارض جانبی^(۲)

آریتمی، گرگرفتگی، افزایش فشارخون، تاکی کاردی، سردرد، لرز، بی حالی، سرگیجه، تعریق، راش پوستی، درد شکمی، بی اشتها، عصبی یا آتورکسیا، یبوست، اسهال، تهوع، سیروز کبدی، واکنش های حساسیتی، آپنه

تداخلات دارویی^(۱)

پاپاورین می تواند باعث کاهش تأثیر درمانی لوودوپا و تشدید اثرات آن در کاهش فشارخون شود.

مصرف در بارداری و شیردهی^(۱)

پاپاورین هیدروکلراید در دسته C بارداری قرار دارد. اطلاعاتی در خصوص ترشح دارو در شیر موجود نیست به همین دلیل لازم است تجویز این دارو با احتیاط و زیر نظر پزشک انجام شود.

شرایط نگهداری

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

References:

1. Drug facts and comparisons 2017. vol 2, pages 1133-1134
2. Uptodate Medical, <https://www.uptodate.com/>
3. Injectable drug 19th Edition. Vol 2, pages 973